


Spezialprechstunde zur speziellen Diagnostik und Behandlung der Harninkontinenz

Termine:

- 1. und 3. Dienstag des Monats im Krankenhaus Freital
 - 1. Mittwoch des Monats in der Tele-Portal-Klinik Dippoldiswalde
- ab 14.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung

Mitzubringen:

- Überweisungsschein vom ambulanten Frauenarzt
- Anmeldung und Terminvereinbarung über das Sekretariat der Frauenklinik (Frau Birkholz) unter der Telefonnummer 03 51 646-6808




Krankenhaus Freital
Bürgerstraße 7 · 01705 Freital
☎ 0351 646-60

Tele-Portal-Klinik Dippoldiswalde
Rabenauer Straße 9
01744 Dippoldiswalde
☎ 03504 632-0

Weißeritztal Kliniken

Freital · Dippoldiswalde

Spezialprechstunde Harninkontinenz



[www.
weisseritztal-
kliniken.de](http://www.weisseritztal-kliniken.de)

Akademisches Lehrkrankenhaus
an der Technischen Universität Dresden

Harninkontinenz

Ungewollter Urinverlust bei Frauen (Harninkontinenz) ist ein häufiges Problem, welches vorwiegend im höheren Alter auftritt, aber auch Frauen in jüngeren Jahren betreffen kann. Oft wird die Problematik aus verschiedenen Gründen von den Betroffenen nicht angesprochen.

Dabei ist in vielen Fällen, besonders bei neu auftretenden Beschwerden, eine effektive Behandlung möglich.



Dr. med. Jörg Wienold
Oberarzt Klinik
für Gynäkologie
und Geburtshilfe

Vor der Behandlung ist es aber wichtig, die Ursache des ungewollten Urinverlustes herauszufinden. Es gibt Arten der Harninkontinenz, die mit der Steuerung der Blasenentleerung durch das Nervensystem zusammenhängen und solche, die durch Organveränderungen von Harnblase und Beckenboden bedingt sind. Entsprechend unterschiedlich ist die Behandlung des unwillkürlichen Urinabgangs.

Oft kann bereits eine zielgerichtete Befragung durch den Arzt die Ursache eingrenzen und helfen, die richtige Behandlung zu finden. In manchen Fällen ist aber eine Unterscheidung der Ursache nur durch eine spezielle Untersuchung möglich.



urodynamischer Messplatz

Die Weißeritztal-Kliniken verfügen an den Standorten Freital und Dippoldiswalde jeweils über einen urodynamischen Messplatz, mit dessen Hilfe die notwendige spezielle Diagnostik realisiert werden kann. Diese Untersuchung wird ambulant durchgeführt. Sie dauert ca. 30 Minuten und ist für die Patientin schmerzfrei.

Nach der Klärung der Ursachen der Inkontinenz kann sich eine ambulante medikamentöse oder auch eine kurzstationäre operative Behandlung anschließen.